

◎年次別悪性新生物とその主要部位である
白血病・悪性リンパ腫の死亡数及び粗死亡率◎

人口10万人対 (総合男女)

年次	悪性新生物		白血病		悪性リンパ腫	
	死亡総数	率	死亡総数	率	死亡総数	率
1950(昭和25)	64428	77.4	1226	1.5		
1955(昭和30)	77721	87.1	2038	2.3		
1960(昭和35)	93773	100.4	2628	2.8		
1965(昭和40)	106536	108.4	3159	3.2		
1970(昭和45)	119977	116.3	3559	3.5		
1975(昭和50)	136383	122.6	4164	3.7		
1980(昭和55)	161764	139.1	4567	3.9		
1983(昭和58)	176206	148.3	4893	4.1		
1984(昭和59)	182280	152.5	5212	4.4		
1985(昭和60)	187714	156.1	5179	4.3		
1986(昭和61)	191654	158.5	5406	4.5		
1987(昭和62)	199563	164.2	5642	4.6		
1988(昭和63)	205470	168.4	5581	4.6		
1989(平成元年)	212625	173.6	5776	4.7		
1990(平成2)	217413	177.2	5633	4.6		
1991(平成3)	223727	181.7	5585	4.5		
1992(平成4)	231917	187.8	5716	4.6		
1993(平成5)	235707	190.4	5819	4.7		
1994(平成6)	243670	196.4	5910	4.8		
1995(平成7)	263022	211.6	6129	4.9	6342	5.1
1996(平成8)	271183	217.5	6275	5	6709	5.4
1997(平成9)	275413	220.4	6356	5.1	6870	5.5
1998(平成10)	283921	226.7	6546	5.2	7291	5.8
1999(平成11)	290556	231.6	6700	5.3	7600	6.1
2000(平成12)	295484	235.2	6766	5.4	7918	6.3
2001(平成13)	300658	238.8	6940	5.5	8057	6.4
2002(平成14)	304568	241.7	6969	5.5	8222	6.5
2003(平成15)	309543	245.4	7018	5.6	8444	6.7
2004(平成16)	320358	253.9	7048	5.6	8401	6.7
2005(平成17)	325941	258.3	7283	5.8	8537	6.8
2006(平成18)	329314	261	7429	5.9	8639	6.8
2007(平成19)	336468	266.9	7607	6	9159	7.3
2008(平成20)	342963	272.3	7675	6.1	9399	7.5
2009(平成21)	344105	273.5	7896	6.3	9857	7.8
2010(平成22)	353499	279.7	8078	6.4	10172	8
2011(平成23)	357305	283.2	8156	6.5	10336	8.2
2012(平成24)	360963	286.6	7900	6.3	10831	8.6

参照資料:e-stat 人口動態調査・死亡 上巻 第5.24表 悪性新生物の主な部位別に
みた性・年次別死亡数及び率に基づいて作成